

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 124
du 23 juin 1988

VIGNE

De nombreux cépages sont au stade fermeture de la grappe.

**** Pourriture grise**

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à l'installation du botrytis.

Dans les parcelles sensibles (cépages à grappes serrées, bas fonds humides, bord de mer) un traitement pourra être réalisé dès maintenant. Vous avez le choix entre : les produits à base de folpel ou CODICAP, MYCODIFOL, BTF, ORGANIL 648, QUINARIS M, BASULTRA, EUPARENE, ou des imides cycliques: KIDAN, ROVRAL, SUMISCLEX, RONILAN FL, RONILAN SP, SILBOS, SILBOS T.

**** Mildiou**

Des taches sont visibles sur feuilles et grappes dans les parcelles mal protégées. Les repiquages sont fréquents. Préférez dans ce cas les produits systémiques.

**** Cicadelles de la flavescence dorée**

Le deuxième traitement doit avoir lieu quinze jours après le premier. Prévoyez le dans la semaine du 4 au 10 juillet.

**** Tordeuses de la grappe**

Dans toutes les parcelles sensibles ou le risque de développement de la pourriture grise est important, un traitement préventif pourra être réalisé dans la semaine du 27 juin au 2 juillet. Dans la majorité des situations, inutile de traiter pour le moment.

P.../47

AGRUMES

Les larves d'aleurodes sont toutes sorties. On observe également le début des éclosions de larves de cochenilles virgules, serpettes et noires de l'olivier ainsi que de nombreux pucerons.

Dans les vergers ou les aleurodes pullulent, réalisez un traitement insecticide **dès réception du bulletin.**

Pour une lutte **spécifique**, contre les cochenilles, effectuez un traitement entre le 10 et le 15 juillet pour toucher un maximum de larves.

ARBRES FRUITIERS

On observe de nombreuses formes mobiles **d'acariens rouges** essentiellement sur pêchers et nectariniers. Intervenir lorsque 70% à 80% des feuilles sont occupées.

MAÏS


Les premières captures de **pyrale du maïs** ont eu lieu fin mai sur Aléria. Ce vol est étalé et les premières pénétrations ont été observées en Marana.

Dans toutes les parcelles attaquées l'an dernier, un traitement est nécessaire entre le 27 juin et le 3 juillet.


Vous avez le choix entre les produits ci-dessous:



bon



moyen



risque de pullulation de pucerons

(1) 0,8l en traitement précoce

0,5l en traitement classique

(2) bonne efficacité s'il est

appliqué à l'époque optimale

Pyrale

Formulation	Matière active	Produit commercial	Dose PC./ha	Efficacité
Granulés	Chlorpyrifos éthyl	Dursban 1,5 G	25 kg	
	Cyperméthrine	Ripcord G, Sherpa 2 G	25 kg	
	Deltaméthrine	Décis MG2	25 kg	
	Fenitrothion	Dotix	25 kg	
	Parathion éthyl	Kriss 2,5 G	25 kg	
	Permethrine	Granador, Perthrine MG	25 kg	
	Phoxime	Volaton 2,5	25 kg	
Liquides	Alphaméthrine	Fastac	0,6 l	
	Cyhalothrine	Karate	0,4 l	
	Cyfluthrine	Baythroid	0,8 l	
	Cyperméthrine	Nombreux	75 g m a	
	Deltaméthrine	Décis CE (1)	0,8 l	
	Fenvalérate	Sumicidin 10 (2)	1,5 l	

[C.F.V. - A.G.F.M.]